

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения  
**Д-Пантенол Новатенол**

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование препарата:** Д-Пантенол Новатенол

**Международное непатентованное название:** декспантенол

**Лекарственная форма:** Мазь для наружного применения

**Состав**

1 г мази содержит:

*действующее вещество:* декспантенол 50 мг;

*вспомогательные вещества:* консервант [феноксиэтанол, метилпарагидроксибензоат, этилпарагидроксибензоат], ланолин, пчелиный воск белый, парафин белый мягкий, диметикон, эмульгатор [цетостеариловый спирт, натрия лаурилсульфат, натрия цетостеарилсульфат], пропиленгликоль, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, декаметилциклопентасилоксан, магния сульфата гептагидрат, основа [воск горный, гидрогенизированное касторовое масло, глицерил моностеарат, масляная кислота, парафин белый мягкий], вода очищенная.

**Описание**

Однородная мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Репарации тканей стимулятор

**Код АТХ:** D03 AX03

**Фармакологические свойства:**

Декспантенол — производное пантотеновой кислоты. В организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, глюкокортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие. Повышение потребности в пантотеновой кислоте наблюдается при повреждении кожного покрова или тканей, а ее недостаток можно восполнить местным применением Д-Пантенола Новатенола. Оптимальная молекулярная масса, гидрофильность и низкая полярность делают возможным его проникновение во все слои кожи.

*Фармакокинетика:* при местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бетаглобулином и альбумином).

**Показания к применению:**

- сухость кожи;
- раны и ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные), царапины, ссадины;
- пролежни, плохо приживающиеся кожные трансплантаты, асептические послеоперационные раны, уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом и колостом;
- дерматиты, фурункулы после вскрытия и санации, трофические язвы нижних конечностей.

Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации.

Лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, сырости).

Уход за грудными детьми:

- профилактика и лечение опрелостей у грудных детей,
- активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, пеленочном дерматите, эритеме от пеленок, царапинах и незначительном раздражении после воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

**Способ применения:**

Наружно. Мазь наносят на поражённый участок кожи 1 или несколько раз в сутки по показаниям. Наносится тонким слоем на поражённый участок кожи, слегка втирая. Кормящим матерям смазывать мазью инфицированную поверхность соска после кормления грудью. Мазь также применяется у детей, в том числе новорожденных. Грудным детям препарат применяют после смены белья или водной процедуры.

**Меры предосторожности:** Лечение трофических язв и плохо заживающих кожных трансплантатов должно проводиться под наблюдением лечащего врача. Не наносить на мокнущие раны.

**Передозировка**

Случаи передозировки не отмечены.

**Побочные действия:** Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительно выраженные аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействие Д-Пантенола Новатенола мази с другими лекарственными средствами для наружного применения не установлено.

**Применение при беременности в период лактации**

Д-Пантенол Новатенол мазь для наружного применения можно применять в период беременности и кормления грудью.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

**Форма выпуска:**

Мазь для наружного применения, 5 %

По 25 г, 50 г препарата в алюминиевой тубе, покрытой защитным лаком с внутренней и внешней стороны, с запаянным защитной мембранной отверстием, с пластиковым навинчивающимся колпачком, снабженным конусообразным приспособлением для прокола защитной мембраны. 1 туба по 25 г вместе с инструкцией по применению в картонной пачке; 1 или 2 тубы по 50 г вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106, Будапешт, ул. Керестури 30-38, Венгрия

Телефон: (36-1)803-5555

Факс: (36-1)803-5529

**Производитель**

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

**Компания, принимающая претензии потребителей:**

ООО «ЭГИС-РУС»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, телефон: (495) 363-39-66